

DEPECTIL EXTRA GARDE FCE

ΠΗΚΤΙΝΟΛΥΤΙΚΑ ΕΝΖΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΛΟΥΣΙΩΝ ΕΡΥΘΡΩΝ ΟΙΝΩΝ

ΧΑΡΑΚΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το **DEPECTIL EXTRA-GARDE FCE** είναι ένα σκεύασμα πηκτινολυτικών ενζύμων με ένα πολύ μεγάλο εύρος συμπληρωματικών δράσεων. Η ειδική αυτή σύνθεση επιτρέπει μια μεγαλύτερη εξαγωγή φαιολικών συστατικών και σταθεροποίηση του χρώματος.

Η παρασκευή του **DEPECTIL EXTRA-GARDE FCE** πραγματοποιήθηκε στο εργαστήριο ενζυμολογίας της Martin Vialatte και δοκιμάστηκε ήδη από το 1999 σε πέντε ποικιλίες. Τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν ότι το DEPECTIL EXTRA-GARDE επιτρέπει την παραγωγή οίνων πιο σύνθετων, με πλουσιότερο χρώμα ενώ η δομή των τανινών εξασφαλίζει μια μεγάλη δυνατότητα παλαίωσης.

Οι πεκτινάσες που περιέχονται στο **DEPECTIL EXTRA-GARDE FCE** παράγονται από ζύμωση επιλεγμένων στελεχών του *Aspergillus niger*, σε φυσικά υποστρώματα.

Το DEPECTIL EXTRA-GARDE FCE είναι ένα σκεύασμα που προορίζεται για χρήση σε ποικιλίες με μεγάλο φαιολικό δυναμικό ή όταν απαιτείται γρήγορη εκχύλιση των τανινών για γρηγορότερη σταθεροποίηση του χρώματος:

- είτε σε σταφύλια με υψηλό δυναμικό που υφίστανται εκχύλιση μακράς διάρκειας με σκοπό την παραγωγή οίνων παλαίωσης,
- είτε σε σταφύλια μερικώς αλλοιωμένα με σκοπό τη γρήγορη εξαγωγή των χρωστικών αποφεύγοντας την εμφάνιση άσχημων γεύσεων (συνδυαστικά με VITANIL VR).

Ενζυματική δράση και σύνθεση:

- Δράσεις: πολυγακτουρονάση (EC 3.2.1.15) >51 000 nkat/g,
πηκτιν-μεθυλ-εστεράση (EC 3.1.1.11) >10 000 nkat/g,
πηκτινλυάση (EC 4.2.2.10) >1 400 nkat/g
ημικυτταρίνη EC 3.2.1.89) > 12 000 nkat/g
- Σύσταση: Πηκτινάση, μαλτοδεξτρίνη & θεικό αμμώνιο. Δεν περιέχει Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς (GMO)

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

Συνιστώμενη δοσολογία : 20-30 gr/tn.

Συμβουλευτείτε οινολόγο για τη δοσολογία στις παρακάτω περιπτώσεις : χαμηλή θερμοκρασία, μικρός χρόνος απολάσπωσης, χαμηλό pH.

Το DEPECTIL ELEVAGE έχει καταταγεί προϊόν Χη-Nocif

R42 : μπορεί να προκαλέσει προβλήματα σε περίπτωση κατάποσης.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαλύστε το **DEPECTIL EXTRA-GARDE FCE** σε γλεύκος ή νερό σε αναλογία 50 gr/L. Αναμίξτε με τον προς κατεργασία όγκο εξασφαλίζοντας καλή ομοιογένεια του συνόλου.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Να μην χρησιμοποιείτε μπεντονίτη ταυτόχρονα με τα ένζυμα διότι αυτά απορροφώνται από το μπεντονίτη και διακόπτεται η δράση του.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Συσκευασία Micro granules: 250 g.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

For Σκόνη: Κατά την παραλαβή στο οινοποιείο διατηρείται, για μικρό χρονικό διάστημα (μερικές ημέρες), σε θερμοκρασία μικρότερη από 25°C, σε μέρος ξηρό, προστατευμένο από το φως, μακριά από έντονες οσμές.

Ανοικτή συσκευασία διατηρείται σε θερμοκρασία μικρότερη από 8 °C - όχι βαθιά ψύξη - και πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Μετά το τέλος της περιόδου του τρύγου, διατηρείται σε θερμοκρασία μικρότερη από 8 °C .

Να χρησιμοποιηθεί κατά προτίμηση πριν από την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στη συσκευασία.

Οι πληροφορίες που παρατίθενται παραπάνω ανταποκρίνονται στις μέχρι σήμερα γνώσεις μας. Παρατίθενται χωρίς υποχρέωση εφαρμογής ή εγγύηση αποτελέσματος όταν οι πειραματισμοί διεξάγονται εκτός ευθύνης μας. Η συμμόρφωση με τη νομοθεσία είναι επιβεβλημένη και αποτελεί ευθύνη του χρήστη. Το παρόν έγγραφο αποτελεί ιδιοκτησία της ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΗ ΙΚΕ και δεν μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς την έγγραφη άδειά μας.