

VIAZYM MP

ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΠΗΚΤΙΝΟΛΥΤΙΚΩΝ ΕΝΖΥΜΩΝ ΓΙΑ ΚΡΥΟΕΚΧΥΛΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΡΟΥΤΩΔΗ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΟΙΝΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το **VIAZYM MP** είναι ένα σκεύασμά ενζύμων με τη μορφή μικροκόκκων, που προέρχεται από τον *Aspergillus niger*, με ισχυρή πηκτινολυτική δράση. Η δραστηριότητά του ενισχύεται περαιτέρω από τις δράσεις κυτταρινάσης και ημικυτταρινάσης. Επίσης, παρουσιάζει ισχυρή δράση β-γλυκοσιδάσης, η οποία συμβάλλει στην απελευθέρωση των αρωμάτων από τις πρόδρομες αρωματικές ενώσεις.

Η απουσία κινναμουϊλεστεράσης στο **VIAZYM MP** αποτρέπει το σχηματισμό ανεπιθύμητων πτητικών φαινολών, που επηρεάζουν αρνητικά το άρωμα των οίνων.

ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Η αποικοδόμηση των πηκτινών βελτιώνει την απόδοση του πιεστηρίου, με καλύτερη απόδοση σε γλεύκος και γρήγορη διαύγαση.
- Παράγει συμπαγείς οινολάσπες.
- Αποικοδομεί τα κυτταρικά τοιχώματα των φλοιών, απελευθερώνοντας πρόδρομες τερπενικές ενώσεις.
- Αναδεικνύει τα ποικιλιακά αρώματα (θειόλες).

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Κρυοεκχύλιση λευκών και ερυθρών για ροζέ οίνους ποικιλιών, για τη παραγωγή φρουτώδη και αρωματικών οίνων.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

Συνιστώμενη δοσολογία: 20 - 40 g/tn, ανάλογα με τη ποικιλία και τη διάρκεια και τη θερμοκρασία της εκχύλισης.

Μέγιστη επιτρεπόμενη δοσολογία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία: Δεν υπάρχει.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαλύστε το **VIAZYM MP** σε περίπου 10 L. νερού ή γλεύκους. Προσθέστε στον προς κατεργασία όγκο και ομογενοποιήστε καλά.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Το παρόν προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική οινολογική χρήση. Να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές της ισχύουσας νομοθεσίας.

037/2020 – 1/2



ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΗ

ΣΥΣΤΑΣΗ

Πηκτινάση, κυτταρινάση, β-γλυκοσιδάση, μαλτοδεξτρίνη.
Δεν περιέχει Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς (GMO).

Ενζυματική δράση:

Πηκτινάση (EC 3.2.1.15) > 20 000 AJDU/ml (g)

Κυτταρινάση (EC 3.2.1.4) > 45 000 mSU/g

β-Γλυκοσιδάση: (EC 3.2.1.21) > 22 000 nkat/g

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Συσκευασία 100g.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Κατά την παραλαβή στο οινοποιείο διατηρείται, για μικρό χρονικό διάστημα (μερικές ημέρες), σε θερμοκρασία μικρότερη από 25°C, σε μέρος ξηρό, προστατευμένο από το φως, μακριά από έντονες οσμές.

Ανοικτή συσκευασία διατηρείται σε θερμοκρασία μικρότερη από 8°C - όχι βαθιά ψύξη - και πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Μετά το τέλος της περιόδου του τρύγου, διατηρείται σε θερμοκρασία μικρότερη από 8°C. Να χρησιμοποιηθεί κατά προτίμηση πριν από την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στη συσκευασία.

Οι πληροφορίες που παρατίθενται παραπάνω ανταποκρίνονται στις μέχρι σήμερα γνώσεις μας. Παρατίθενται χωρίς υποχρέωση εφαρμογής ή εγγύηση αποτελέσματος όταν οι πειραματισμοί διεξάγονται εκτός ευθύνης μας. Η συμμόρφωση με τη νομοθεσία είναι επιβεβλημένη και αποτελεί ευθύνη του χρήστη. Το παρόν έγγραφο αποτελεί ιδιοκτησία της ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΗ ΙΚΕ και δεν μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς την έγγραφη άδειά μας.