



NUTRICELL® START

ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΘΡΕΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΛΚΟΟΛΙΚΗΣ ΖΥΜΩΣΗΣ



**Αποτελεσματική
ενεργοποίηση της
έναρξης της
αλκοολικής ζύμωσης**

**Σύνθετο προϊόν
θρέψης**

**Οργανική &
ανόργανη θρέψη**



ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

- Αποτελείται από φωσφορικό διαμμώνιο, προϊόντα αυτόλυσης ζυμών και αδρανείς ζύμες, τα οποία αποτελούν σημαντικές πηγές αφομοιώσιμου άζωτου.
- Τα παράγωγα των ζυμών απελευθερώνουν τις βιταμίνες και τα ιχνοστοιχεία που είναι απαραίτητα για τον σωστό μεταβολισμό των ζυμών και τα λιπίδια που βελτιστοποιούν την απόδοση των σακχαρομυκήτων, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις έντονης απολάσπωσης.
- Περιέχει κελύφη ζυμών τα οποία χάρη στην αποτοξινωτική τους δράση βελτιώνουν την ολοκλήρωση της αλκοολικής ζύμωσης σε περίπτωση καταπόνησης των ζυμομυκήτων (χαμηλές θερμοκρασίες, υπερβολική διάγασση, υψηλός αλκοολικός βαθμός κτλ.).
- Περιέχει επίσης θειαμίνη, βιταμίνη η οποία είναι απαραίτητη για τον καλό πολλαπλασιασμό των σακχαρομυκήτων.



ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

Συνιστώμενη δοσολογία: 200 - 600 g/tn ανάλογα με τις θρεπτικές ανάγκες του ζυμομύκητα και τη συγκέντρωση σε αφομοιώσιμο άζωτο του γλεύκους.

Μέγιστη επιτρεπόμενη δοσολογία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία: 600 g/tn.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ



**1 KG
10 KG**



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Συσκευασία γεμάτη, σφραγισμένη από τον κατασκευαστή, διατηρείται σε μέρος ξηρό και προστατευμένο από το φως, μακριά από έντονες οσμές.

Συσκευασία ανοικτή, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί εντός σύντομου χρονικού διαστήματος. Να χρησιμοποιηθεί κατά προτίμηση πριν από την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στη συσκευασία.

Οι πληροφορίες που παρέχονται εδώ βασίζονται στην τρέχουσα κατάσταση των γνώσεων μας. Οι πληροφορίες αυτές είναι μη δεσμευτικές και χωρίς εγγύηση, καθώς οι συνθήκες χρήσης είναι πέρα από τον έλεγχό μας. Δεν απαλλάσσουν τον χρήστη από τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία και τα δεδομένα ασφαλείας. Το παρόν έγγραφο αποτελεί ιδιοκτησία της SOFRALAB και δεν μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς τη συγκατάθεσή της.



ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαλύστε το **NUTRICELL® START** σε 10-πλάσιο του βάρους του ποσότητα νερού ή γλεύκους (1kg σε 10L). Ενσωματώστε στον προς επεξεργασία όγκο γλεύκους και ομογενοποιήστε καλά.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Το παρόν προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική οινολογική χρήση. Να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές της ισχύουσας νομοθεσίας.



ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΘΡΕΨΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΦΟΜΟΙΩΣΙΜΟ ΑΖΩΤΟ ΤΟΥ ΓΛΕΥΚΟΥΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

YAN < 80 mg/L		80 mg/L < YAN < 140 mg/L	140 mg/L < YAN < 250 mg/L
	Και/ή 		
200 g/tn κατά την διάρκεια του εμβολιασμού	200 g/tn μετά το 1/3 της A.Z	200 g/tn + 200 g/tn διαδοχική προσθήκη κατά τη διάρκεια του 1/3 της A.Z.	100 g/tn + 100 g/tn διαδοχική προσθήκη κατά τη διάρκεια του 1/3 της A.Z.
Ανώτερες Αλκοόλες	++	+++	+++